

Link do produktu: <https://agrolinija.pl/dolistny-biostymulator-wzrostu-folium-20l-zboza-ozime-p-47.html>



Dolistny Biostymulator Wzrostu Folium 20L Zboża Ozime

Cena	750,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Folium25L
Kod producenta	Folium25L

Opis produktu

Opis produktu

AGRO-SORB Folium to skuteczny i bardzo wydajny biostymulator wzrostu w postaci płynnej zawierający naturalne aminokwasy lewoskrętne które powstały z hydrolizy enzymatycznej. **AGRO-SORB FOLIUM** oprócz aminokwasów zawiera aktywne substancje takie jak związki lipidowe ,sterole wzbogacone mikroelementami takimi jak **bor(B)** ,**mangan(Mn)** i **cynk(Zn)** .

Głównym zadaniem biostymulatora **Agro-Sorb Folium** jest szybka regeneracja roślin po okresach stresowych ,zwiększa wzrost fotosyntezy ,poprawia i przyczynia się do zwiększenia kwitnienia, zwiększa liczbę łuszczyń, poprawia kondycję roślin czego wtórnym efektem jest zwiększenie odporności roślin na różnego rodzaju choroby i warunki pogodowe ,wzmacnia system korzeniowy, dzięki aminokwasom zawartym w biostymulatorze rośliny szybciej i skuteczniej przyswajają mikro i makroelementy z gleby oraz inne nawozy skuteczność 90%.

Agro-Sorb Folium jest mieszalny z innymi nawozami dolistnymi i tu zalecamy połączenie z nawozem **Agrolinija-S** efekty wizualne są widoczne po kilku dniach od zastosowania .


Stosować można

- ✓Uprawa roślin polowych (zboża ,trawy ,kukurydza ,rzepak ,soja ,łubin itp.)
- ✓Sadownictwo
- ✓Warzywnictwo
- ✓Uprawach roślin ozdobnych , trawniki

Skład

Wolne aminokwasy.....	(102g/L), 9,3% (m/m)
Aminokwasy ogółem.....	12% (m/m)
Azot całkowity (N).....	2,1% (m/m)
Bor (B).....	0,02% (m/m)
Mangan (Mn).....	0,05% (m/m)
Cynk (Zn).....	0,07% (m/m)
Postać.....	Płynna


W połączeniu z nawozem **Agrolinija-S** zalecana dawka to od 0,5L do 1L na 1 hektar przy cieczy roboczej 200/300L



Uprawa	Stosowanie	Dawka l/ha (jednorazowa)	Ilość cieczy roboczej l/ha	Termin
Rzepak ozimy	Dolistne	1-2	200-300	Wykonać min. 3 zabiegi: - pierwszy jesienią w fazie 5-8 liści, 1-2 zabiegi wiosną: - pierwszy po wznowieniu wegetacji, - drugi przed kwitnieniem, - każdorazowo po wystąpieniu warunków stresowych.

Rzepak jary


Skala BBCH / 2-cyfrowy kod dziesiętny



Uprawa	Stosowanie	Dawka l/ha (jednorazowa)	Ilość cieczy roboczej l/ha	Termin
Rzepak jary	Dolistne	1-2	200-300	Wykonać min. 1-2 zabiegi: • pierwszy w fazie 5-8 liści, • drugi przed kwitnieniem, • każdorazowo po wystąpieniu warunków stresowych.

Zboża jare


Skala BBCH / 2-cyfrowy kod dziesiętny



Uprawa	Stosowanie	Dawka l/ha (jednorazowa)	Ilość cieczy roboczej l/ha	Termin
Zboża jare	Dolistne	1-2	200-300	Wykonać min. 1-2 zabiegi: • pierwszy w fazie krzewienia roślin, • drugi w fazie kłoszenia (przed kwitnieniem) • każdorazowo po wystąpieniu warunków stresowych.

Zboża ozime


Skala BBCH / 2-cyfrowy kod dziesiętny



Uprawa	Stosowanie	Dawka l/ha (jednorazowa)	Ilość cieczy roboczej l/ha	Termin
Zboża ozime	Dolistne	1-2	200-300	Wykonać min. 3 zabiegi: 1 zabieg jesienią w fazie 3-4 liści, 1-2 zabiegi wiosną: - pierwszy w fazie ruszenia wegetacji, - drugi w fazie kłoszenia (przed kwitnieniem) - każdorazowo po wystąpieniu warunków stresowych.

Kukurydza

Skala BBCH / 2-cyfrowy kod dziesiętny



Uprawa	Stosowanie	Dawka l/ha (jednorazowa)	Ilość cieczy roboczej l/ha	Termin
Kukurydza	Dolistne	1-2	200-300	Wykonać min. 1-2 zabiegi: • od fazy 4-6 liści do uzyskania wysokości roślin uniemożliwiającej zabiegi oprysku, • każdorazowo po wystąpieniu warunków stresowych.

Nie stosować z nawozami i środkami ochrony roślin, które tworzą roztwory zasadowe oraz z miedzianami.